

**BIRINCHI TRIMESTRDA RETROXORIAL GEMATOMA:
HOMILADORLIK NATIJALARINI ANIQLASHDA ZAMONAVIY
PROGNOZLASH YONDASHUVI**

Sharipova F.X

Yangiyeva S.U

Buxoro shahar tug'ruq kompleksi.

*Buxoro davlat tibbiyot institute Abu Ali ibn Sino nomidagi
akesherlik va ginekologiya kafedrası.*

Dolzarbligi: Retroxorial gematoma homiladorlikning birinchi trimestrida eng ko'p uchraydigan ultratovush topilmalaridan biri bo'lib, ko'pincha tushish xavfi klinik belgilari bilan namoyon bo'ladi. Homiladorlik ayrim hollarda asoratlarsiz kechishi mumkin bo'lsa-da, ushbu holat spontan abort, platsentar yetishmovchilik, muddatidan oldin tug'ruq va homila o'sishining kechikishi xavfini sezilarli darajada oshiradi. Prognoz mezonlarining yagona tizimi mavjud emasligi kompleks baholash zaruratini kuchaytiradi.

Tadqiqot maqsadi: Birinchi trimestrda retroxorial gematoma aniqlangan homilador ayollarda klinik, ultratovush va laborator ko'rsatkichlarning prognoz ahamiyatini baholash.

Materiallar va usullar: Birinchi trimestrda retroxorial gematoma tashxisi qo'yilgan homilador ayollarning retrospektiv va prospektiv tahlili o'tkazildi. Ultrasonografiya yordamida gematomaning hajmi, lokalizatsiyasi, dinamikasi va homila qopchasi hajmiga nisbati baholandi. Klinik belgilar — vaginal qon ketish va og'riq sindromi qayd etildi. Laborator tekshiruvlar doirasida gormonal profil (xususan progesteron darajasi) hamda gemostaz tizimi ko'rsatkichlari o'rganildi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari retroxorial gematomaning prognostik ahamiyati uning hajmi, lokalizatsiyasi va klinik kechishi bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. Katta hajmli gematomalar (homila qopchasi hajmining 30–50% dan ortig'i) spontan abort xavfini sezilarli oshiradi. Orqa devor va fundal joylashuv noqulay prognoz bilan bog'liq ekani aniqlandi. Uzoq davom etuvchi yoki takrorlanuvchi qon ketish hamda og'riq sindromi patologik jarayon faolligini ko'rsatadi.

Dinamik kuzatuv gematomaning regressiyasining yo'qligi mustaqil salbiy prognostik omil ekanligini tasdiqladi. Progesteron darajasining pasayishi trofoblast funksiyasining buzilishi va bachadon tonusining oshishi bilan bog'liq bo'ldi. Gemostaz tizimidagi o'zgarishlar platsentar qon aylanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, gematomaning saqlanib qolishiga xizmat qilishi mumkin.

Kompleks yondashuv asosida ushbu omillarni birgalikda baholash homiladorlik natijalarini aniqroq prognozlash imkonini berdi va individual kuzatuv strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Xulosa: Retroxorial gematoma homiladorlikning erta bosqichida muhim prognostik omil hisoblanadi. Klinik, ultratovush va laborator ko'rsatkichlarni kompleks baholash xavf guruhlarini aniqlash imkonini beradi. Erta tashxis va individual yondashuv asosida olib

15-Aprel, 2026-yil

borilgan kuzatuv homiladorlik natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi hamda asoratlar xavfini kamaytiradi.