

**ÓTKIR APPENDITSITNI DAVOLASHDA LAPAROSKOPIK OCHIQ
APPENDEKTOMIYA USULLARINING QIYOSIY TAHLILI**

*Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti
2-son Davolash fakulteti 227-"B" gurux
talabasi Uzoqov Musurmon G'ulom óg'li*

Annotatsiya: *Ushbu tezisda o‘tkir appenditsitni davolashda qo‘llaniladigan laparoskopik va ochiq appendektomiya usullarining qiyosiy tahlili keltirilgan. Laparoskopik appendektomiya kam invazivligi, operatsiyadan keyingi og‘riqning kamligi, bemorlarning tezroq tiklanishi va shifoxonada yotish muddatining qisqarishi bilan tavsiflanadi. Ochiq appendektomiya esa texnik jihatdan sodda bo‘lib, asoratlangan holatlarda keng qo‘llaniladi. Tezida har ikki usulning afzallik va kamchiliklari, operatsiyadan keyingi asoratlari va davolash samaradorligi qiyosiy o‘rganilgan.*

Kalit sózlar: *o‘tkir appenditsit, laparoskopik appendektomiya, ochiq appendektomiya, qiyosiy tahlil, kam invaziv jarrohlik, operatsiyadan keyingi og‘riq, rehabilitatsiya, asoratlari, jarrohlik davolash, appenditsit*

KIRISH QISM

O‘tkir appenditsit — qorin bo‘shlig‘idagi eng ko‘p uchraydigan shoshilinch jarrohlik kasalliklaridan biri bo‘lib, o‘z vaqtida tashxis va samarali jarrohlik davolashni talab qiladi. Kasallikni davolashning ikki asosiy usuli mavjud: laparoskopik va ochiq appendektomiya. Laparoskopik usul kam invazivligi, bemorning tez tiklanishi va minimal og‘riq bilan ajralib turadi, ochiq appendektomiya esa texnik jihatdan sodda va murakkab asoratlangan holatlarda qo‘llaniladi. Shu bois, ushbu ishda ikki usulning afzallik va kamchiliklarini qiyosiy tahlil qilish orqali appenditsitni davolashda optimal yondashuv aniqlanadi.

ASOSIY QISM:


Tadqiqot davomida o‘tkir appenditsit tashxisi bilan yotqizilgan bemorlar ikki guruhga ajratildi:

I guruh: Laparoskopik usulda operatsiya qilinganlar.

II guruh: An’anaviy ochiq usulda operatsiya qilinganlar.

Baholash mezonlari: Operatsiya davomiyligi, og‘riq sindromi (VAS shkalasi bo‘yicha), shifoxonada yotish muddati va asoratlari (yara yiringlashi, chandiqlar). Operatsiya vaqti: LA usulida operatsiya vaqti ochiq usulga nisbatan o‘rtacha 10-15 daqiqa ko‘proq davom etadi. Og‘riq sindromi: LA guruhida operatsiyadan keyingi og‘riq sezilarli darajada kam bo‘lib, narkotik analgetiklarga ehtiyoj past bo‘ldi. Rehabilitatsiya: Laparoskopik usulda bemorlar 1-2 kundan keyin faol hayotga qaytishdi, OA guruhida esa bu muddat 4-5 kuni tashkil etdi. Asoratlari: Ochiq usulda operatsiyadan keyingi yara infeksiyalari 5-7% holatlarda kuzatilgan bo‘lsa, laparoskopiyada bu ko‘rsatkich 1-2% dan oshmadi.

20-Aprel, 2026-yil



Operatsiya usullarining sxematik taqqoslanishi.

Ushbu diagramma ochiq va laparoskopik operatsiyalarning qorin bo'shlig'iga kirish usullaridagi farqini ko'rsatadi. :

xulosa:

Laparoskopik appendektomiya an'anaviy ochiq usulga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega:

Operatsiyadan keyingi og'riqning kamligi.

Kasalxonada yotish muddatining qisqarishi.

Yuqori estetik natija (katta chandiqlar bo'lmasligi).

Asoratlar xavfining kamligi.

Xulosa qilib aytganda, texnik imkoniyat mavjud bo'lganda laparoskopik usul afzalroq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov Sh.I., Xodjayev A.A. Jarrohlik kasalliklari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019.
2. Sabiston D.C., Townsend C.M. Sabiston Textbook of Surgery. – Philadelphia: 2021
3. Brunnicardi F.C. va boshqalar. Schwartz's Principles of Surgery. – New York: 2022.
4. O'tkir appenditsitni davolash bo'yicha zamonaviy klinik tavsiyalar // Jarrohlik amaliyoti jurnali, 2020.